

IMPUGNACIÓN A LA PREGUNTA Nº 144 (DE LA VERSIÓN 0)
DEL CUESTIONARIO DE EXAMEN PARA PSICÓLOGOS CLÍNICOS

RESPUESTA APROBADA POR LA COMISIÓN: 2
RESPUESTA QUE ENTIENDE CORRECTA: 3

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

-Asociación Americana de Psiquiatría. (2013). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5ª ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. Página 253-254

JUSTIFICACIÓN:

Se da por correcto que la tricotilomanía muestra tasas de comorbilidad altas con el abuso de sustancias. En DSM-5, manual de referencia para el diagnóstico y con datos epidemiológicos muy actualizados, se citan de forma explícita las comorbilidades con **trastorno depresivo mayor** y con **excoriación**, así como otros trastornos del espectro TOC, pero **no se nombra el abuso de sustancias** (página 254). En este mismo manual, en la parte de desarrollo y curso se plantea que esta conducta puede aparecer en bebés, y que suele resolverse, y que el trastorno suele aparecer **a partir de la adolescencia**, y cronificarse a partir de esa edad, de lo que podemos extraer que es más frecuente en la edad adulta que en la infancia. Por ello creemos que la opción correcta es la 3.